用于治疗斑块状银屑病的低剂量甲氨蝶呤 (METHOTREXATE)

斑块状银屑病是一种影响皮肤的自身免疫性疾病。虽然无法治愈,但许多斑块状银屑病患者发现,通过正确的治疗,他们的症状可以得到很好的控制。低剂量甲氨蝶呤是一种可以用于治疗斑块状银屑病的药物。 使用此治疗方案与您的皮肤科医生讨论甲氨蝶呤。本资料单可以帮助您了解此药物的好处和风险,以

及监控和定期复查的必要性。

甲氨蝶呤控制疾病的作用机制

甲氨蝶呤与只作用于皮肤表面的局部治疗(如,面霜、药膏和乳液)不同。它通过中断引起银屑病的过度活跃免疫系统来起作用。这会减慢皮肤细胞的生长并减少炎症。



甲氨蝶呤每周用一次。

用法:有口服的片剂,也有注射液,可进行皮下注射(皮下)或肌肉注射(肌内)。

与片剂相比, 甲氨蝶呤注射液

✓ 更有效,而且

副作用可能更少。

甲氨蝶呤

- ✓ 控制斑块状银屑病
- ✓ 减少病情复发

- ✓ 减少对糖皮质激素(也称为皮质类固醇或类固醇)的需求
- ✓ 降低因未得到控制的炎症而引起的并发症的机率

事实焦点

对于甲氨蝶呤的误解可能是治疗的障碍。了解事实有助于人们坚持治疗并改善结果。

事实

用于治疗斑块状银屑病的 低剂量甲氨蝶呤安全有效 一 在这些剂量下不被视为 化疗。

误解

低剂量甲氨蝶呤是化疗。

事实

甲氨蝶呤需要时间才能起作用 — 您可能在6-12周后才开始感觉到皮肤有改善。

误解

您会立即感觉到甲氨蝶呤 的效果。

事实

甲氨蝶呤可以由您自己、 家人或朋友安全地进行 注射。

误解

给自己注射甲氨蝶呤是不 安全的。

事实

使用甲氨蝶呤治疗斑块状 银屑病的人可以与孕妇进 行正常接触。

误解

使用甲氨蝶呤的人不能靠 近孕妇。

持续护理

验血

定期验血用于检查治疗是否有效并监测副作用、测量肾和肝功能以及进行全血细胞计数。随着时间的推移,检测次数将会逐渐减少。

临床检查

继续与开药的医生定期检查您的斑块状银屑病。复诊间隔取 决于疾病的活跃程度。

疫苗接种

及时接种肺炎球菌和流感疫苗。

皮肤检查

甲氨蝶呤会略微增加某些类型的皮肤癌的风险。因此建议每 年进行皮肤检查。

牛殖健康

如果您打算要孩子,您应该寻求专科医生的建议。女性在使用甲氨蝶呤时应采取避孕措施,在计划怀孕前3个月必须停用甲氨蝶呤,并在使用甲氨蝶呤期间避免母乳喂养。







治疗方案

如何使用低剂量的甲氨蝶呤

与您的医疗团队共用此治疗方案,以帮助您实现治疗目标。

我什么时候用药 中氨蝶呤 每周一次 叶酸 在不用甲氨 加服叶酸有助于 蝶呤的每周 减少甲氨蝶呤的 其他天

_	_	~ <i>L</i>	-	1	*	
	$\overline{}$	-/	ľ/	险	台	•
		"	✓.	1.7	ᆖ	۰

我用于	治疗斑块	张银屑	病
的其他	药物包括	5 :	

什么时候联系我的医生

● 紧急

如果我有新的感染。感染症状包括发烧、皮肤发红或疼痛,或有伤口。

如果我出现呼吸困难和/或干咳。

● 尽快

如果我的斑块状银屑病突然发作。

● 定期

预约定期检查以监测我的病情发展和药物。

检查我是否接种了最新的疫苗并寻求有关旅行疫苗的建议。 如果我正在使用或计划使用任何其他药物,包括非处方药、 草药和自然疗法药物。

甲氨蝶呤的副作用

像所有药物一样,甲氨蝶呤可能会引起副作用。

最常见的副作用包括:

- ▶ 恶心、呕吐、腹泻
- ▶ □腔溃疡
- ▶ 疲倦、头痛和意识模糊
- ▶ 皮肤对阳光的敏感性增加。

如果您担心,请咨询您的医生。与食物一起服用或在晚上使用 甲氨蝶呤可能会减少副作用。

更多信息

NPS MedicineWise (nps.org.au/dermatology-consumers)

下载 MedicineWise app 跟踪您的药物使用并获取体检信息,例如验血结果。

NPS Medicines 电话: 1300 633 424



+靶向治疗合作机构

帮助消费者和医疗专业人士就生物类疾病缓解抗风湿药(bDMARDs)和其他专业药物做出安全和明智的治疗决定。由澳大利亚政府卫生部通过 Value in Prescribing bDMARDs Program Grant 资助。





